



Sugerowane kryteria włączenia terapii żywieniowej u dzieci¹

Niewystarczające spożycie żywności drogą doustną.

Wyniszczenie/niedożywienie, zahamowanie tempa wzrostu



- Brak możliwości pokrycia > 60-80% zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze > 10 dni
- U dzieci >1 r.ż. życia interwencję żywieniową należy rozpocząć w ciągu 5 dni, a u dzieci < 1 r.ż. w ciągu 3 dni od momentu utraty zdolności karmienia drogą doustną
- Całkowity czas karmienia u dzieci niepełnosprawnych >4-6 h/24 h

- Nieprawidłowy wzrost lub przyrost masy ciała >1 miesiąc u dzieci <2 rż
- Utrata masy ciała lub brak przyrostu masy ciała >3 miesiące u dzieci > 2 roku życia
- Zmniejszenie masy ciała w stosunku do wzrostu o ponad 2 kanały centylowe
- Spadek tempa wzrostu >2cm/rok w stosunku do poprzedniego roku u dzieci w początkowej/ środkowej fazie dojrzewania płciowego.

¹ ESPGHAN Committee on Nutrition: Christian Braegger, Tamas Decsi, Jorge Amil Dias, Corina Hartman, Sanja Kolacek, Berthold Koletzko, Sibylle Koletzko, Walter Mihatsch, Luis Moreno, John Puntis, Raanan Shamir, Hania Szajewska, Dominique Turck, Johannes van Goudoever Practical Approach to Paediatric Enteral Nutrition: A Comment by the ESPGHAN Committee on Nutrition JPN Volume 51, Number 1, July 2010